

# ROSENSON-SCORE ZUR DIAGNOSTIK STATIN-ASSOZIIERTER MUSKELSYMPTOME (SAMS)

## Klinische Symptomatik

Punkte

### Lokalisation/Verteilungsmuster der Schmerzen

Symmetrisch, Hüftbeuger/Oberschenkel	3
Symmetrisch, Wade	2
Symmetrisch, obere proximale Schmerzen	2
Unspezifisch, asymmetrisch, intermittierend	1

### Zeitlicher Zusammenhang mit Beginn der Statin-Einnahme

Symptombeginn < 4 Wochen	3
Symptombeginn 4–12 Wochen	2
Symptombeginn > 12 Wochen	1

### Besserung nach Absetzen

innerhalb von < 2 Wochen	2
innerhalb von 2–4 Wochen	1
Keine Besserung nach Absetzen	0

### Neuerliche Einnahme eines Statins

Die selben Symptome treten nach < 4 Wochen wieder auf	3
Die selben Symptome treten innerhalb von 4–12 Wochen wieder auf	1

## Diagnose Statin-assoziiertes Muskelbeschwerden

Punkte

Wahrscheinlich	9–11
Möglich	7–8
Unwahrscheinlich	< 7

\* Falls mehr als eine Antwort zutrifft, wird nur die höchste Punktezahl notiert.

Referenz: Rosenson et al, JACC, 2017; 70 (10): 1290–301

SC-AT-AMG145-01236 Apr 2023



Amgen GmbH, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien  
[www.amgen.at](http://www.amgen.at)