

ABSCHÄTZUNG DER VORBEHANDLUNGS-LDL-CHOLESTERIN-KONZENTRATION

Die Abschätzung der Vorbehandlungs-LDL-Cholesterin-Konzentration ist zum Beispiel beim Ausfüllen der Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) Diagnosekriterien notwendig.

Sollte Ihr Patient/Ihre Patientin derzeit lipidsenkende Medikamente einnehmen und ein LDL-Cholesterin-Wert vor der Behandlung mit einer lipidsenkenden Therapie nicht verfügbar sein, bietet Ihnen die nachstehende Tabelle eine Hilfestellung zur Abschätzung der LDL-Cholesterin-Konzentration vor der Therapie: Multiplizieren Sie die aktuelle LDL-Cholesterin-Konzentration des Patienten/der Patientin mit der Zahl, die der aktuellen Therapie zugeordnet ist (siehe Tabelle unten) und Sie erhalten den entsprechenden geschätzten Vorbehandlungs-LDL-Cholesterin-Wert. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Dosierungen möglicherweise nicht in jedem Land zugelassen sind.

Therapie (mg/Tag)	Korrekturfaktor	Therapie (mg/Tag)	Korrekturfaktor
Ezetimib		Atorvastatin	
10	1,2	10	1,6
Pravastatin		20	1,8
10	1,2	40	2,0
20	1,3	80	2,2
40	1,5	Atorvastatin + Ezetimib	
Pravastatin + Ezetimib		10 + 10	2,0
10 + 10	1,5	20 + 10	2,2
20 + 10	1,6	40 + 10	2,2
40 + 10	1,7	80 + 10	2,5
Simvastatin		Rosuvastatin	
10	1,4	5	1,8
20	1,6	10	1,9
40	1,7	20	2,1
80	1,9	40	2,4
Simvastatin + Ezetimib		Rosuvastatin + Ezetimib	
10 + 10	1,9	10 + 10	2,5
20 + 10	2,0	20 + 10	2,7
40 + 10	2,3	40 + 10	3,3
80 + 10	2,4		

SC-AT-AMG145-01235 0725

Referenz: Haralambos K, et al. Atherosclerosis 2015; 240: 190–96.