

ROSENSON-SCORE ZUR DIAGNOSTIK STATIN-ASSOZIIERTER MUSKELSYMPTOME (SAMS)

Klinische Symptomatik	Punkte
Lokalisation/Verteilungsmuster der Schmerzen	
Symmetrisch, Hüftbeuger/Oberschenkel	3
Symmetrisch, Wade	2
Symmetrisch, obere proximale Schmerzen	2
Unspezifisch, asymmetrisch, intermittierend	1
Zeitlicher Zusammenhang mit Beginn der Statin-Einnahme	
Symptombeginn < 4 Wochen	3
Symptombeginn 4–12 Wochen	2
Symptombeginn > 12 Wochen	1
Besserung nach Absetzen	
innerhalb von < 2 Wochen	2
innerhalb von 2–4 Wochen	1
Keine Besserung nach Absetzen	0
Neuerliche Einnahme eines Statins	
Die selben Symptome treten nach < 4 Wochen wieder auf	3
Die selben Symptome treten innerhalb von 4–12 Wochen wieder auf	1
Diagnose Statin-assoziiertes Muskelbeschwerden	
Punkte	
Wahrscheinlich	9–11
Möglich	7–8
Unwahrscheinlich	< 7

* Falls mehr als eine Antwort zutrifft, wird nur die höchste Punktezahl notiert.

Referenz: Rosenson et al, JACC, 2017; 70 (10): 1290–301

SC-AT-AMG145-01236 0725

